Vascutan Plus Irbesartán / Hidroclorotiazida

Tabletas de 150 mg +12,5 mg / 300 mg + 12,5 mg / 300 MG + 25 mg

Composición:

Cada Tableta sin recubrimiento contiene:
Irbesartán + Hidroclorotiazida
Equivalente a Irbesartán USP.....150 mg
Equivalente a Hidroclorotiazida USP .....12.5 mg
Excipientes ..... QS
Color:Blanco

Composición:

Cada Tableta sin recubrimiento contiene:
Irbesartán + Hidroclorotiazida
Equivalente a Irbesartán USP.....300 mg
Equivalente a Hidroclorotiazida USP ...12.5 mg
Excipientes ..... QS
Color:Blanco

Composición:

Cada Tableta sin recubrimiento contiene:
Irbesartán + Hidroclorotiazida
Equivalente a Irbesartán USP.....300 mg
Equivalente a Hidroclorotiazida USP.....25 mg
Excipientes ..... QS
Color:Blanco

PARA QUÉ SE UTILIZAN LAS TABLETAS DE VASCUTAN PLUS:

Las tabletas de VASCUTAN PLUS contienen dos medicamentos, irbesartán e hidroclorotiazida. Ambos medicamentos se encuentran en las tabletas que le ha recetado su médico.

Las tabletas de VASCUTAN PLUS reducen la presión arterial alta, lo que los médicos llaman hipertensión.

Su médico midió su presión arterial y encontró que estaba demasiado alta. Todo el mundo tiene presión arterial. Esta presión ayuda a que la sangre circule por todo el cuerpo. Su presión arterial puede ser diferente en diferentes momentos del día, dependiendo de qué tan ocupado o preocupado esté. Tiene hipertensión (presión arterial alta), lo que significa que su presión arterial se mantiene alta, incluso cuando está tranquilo y relajado.

Por lo general, no hay síntomas de presión arterial alta. La única forma de saber que tiene hipertensión es controlándose la presión arterial con regularidad. La presión arterial alta, si no se trata, puede dañar los vasos sanguíneos de varios órganos, como el corazón, los riñones, el cerebro y los ojos. Esto puede provocar ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca o renal, accidentes cerebrovasculares o ceguera. Por lo general, no hay síntomas de presión arterial alta antes de que ocurra el daño, por lo que su médico debe medir su presión arterial para ver si es demasiado alta.

La presión arterial alta se puede tratar y controlar con medicamentos como VASCUTAN PLUS tabletas. Es posible que su médico también le haya recomendado que ajuste su estilo de vida para ayudar a reducir su presión arterial alta (bajar de peso, evitar fumar, reducir el consumo de alcohol y restringir la cantidad de sal en la dieta). Es posible que su médico también le haya recomendado la práctica de ejercicio regular, suave (no extenuante), como caminar, nadar, usar las escaleras en lugar del ascensor, las tareas domésticas o la jardinería.

QUÉ HACE VASCUTAN PLUS Y CÓMO FUNCIONA:

VASCUTAN PLUS contiene irbesartán e hidroclorotiazida. Ambos medicamentos reducen la presión arterial en diferentes caminos. Irbesartán pertenece a un grupo de medicamentos conocidos como antagonistas de los receptores de la angiotensina-II. La angiotensina-II es una sustancia producida en el cuerpo que hace que los vasos sanguíneos se contraigan. Irbesartán bloquea la angiotensina-II y, por lo tanto, relaja los vasos sanguíneos. Esto ayuda a bajar la presión arterial.

La hidroclorotiazida pertenece a la clase de medicamentos conocidos como diuréticos. Los diuréticos provocan un aumento del volumen de orina. También ayudan a reducir la presión arterial, especialmente cuando se combinan con otros medicamentos para reducir la presión arterial. Es posible que su médico le haya recetado tabletas de VASCUTAN PLUS para otro uso. Si desea más información, pregunte a su médico.

CUÁNDO NO DEBE TOMAR VASCUTAN PLUS TABLETAS:

No tome tabletas de VASCUTAN PLUS si:
• está embarazada (o cree que puede estarlo) o tiene intención de quedarse embarazada. Su bebé puede absorber este medicamento en el útero y existe la posibilidad de daño al bebé.
• está amamantando. No se sabe si VASCUTAN PLUS pasa a la leche materna. Su médico decidirá si interrumpir la lactancia o suspender el medicamento.
• es alérgico a irbesartan o hidroclorotiazida o a medicamentos derivados de sulfonamidas, o a cualquiera de los ingredientes enumerados en la Descripción del producto al principio de este prospecto.
• está tomando un medicamento que contiene aliskiren y tiene diabetes o insuficiencia renal de moderada a grave.
• no está produciendo orina.
• el embalaje está roto o muestra signos de manipulación.
• ha pasado la fecha de caducidad del envase.
Si toma este medicamento después de que haya pasado la fecha de caducidad, es posible que no funcione.

Si no está seguro de si debe empezar a tomar VASCUTAN PLUS tabletas, hable con su médico.

Las tabletas de VASCUTAN PLUS no deben administrarse a niños.

ANTES DE EMPEZAR A TOMAR LOS TABLETAS DE VASCUTAN PLUS:

Informe a su médico si:

• está o tiene la intención de quedar embarazada o planea amamantar. Las tabletas de VASCUTAN PLUS no deben utilizarse durante el embarazo o la lactancia.
• recientemente ha tenido vómitos o diarrea excesivos o cree que está deshidratado
• padece alguna afección médica, especialmente:
- problemas renales, o ha tenido un trasplante de riñón o diálisis
- problemas del corazón
- problemas hepáticos, o ha tenido problemas hepáticos en el pasado
- diabetes
- gota o ha tenido gota en el pasado
- lupus eritematoso
- niveles altos o bajos de potasio o sodio u otros electrolitos en la sangre
- aldosteronismo primario
- está restringiendo estrictamente su consumo de sal
- es intolerante a la lactosa o ha tenido alguna alergia a algún otro medicamento o a cualquier otra sustancia, como alimentos, conservantes o colorantes

Crassula®

- han tenido una simpatectomía
- ha estado tomando diuréticos
- tiene antecedentes de alergia o asma

Asegúrese de informar a su médico acerca de cualquiera de estas cosas antes de tomar cualquier tableta de VASCUTAN PLUS.

Toma de tabletas de VASCUTAN PLUS con otros medicamentos:

Informe a su médico si está tomando otros medicamentos, incluidos los que compra sin receta en su farmacia, supermercado o tienda de alimentos saludables.

Es especialmente importante que informe a su médico si está tomando o planea tomar alguno de los siguientes:
• otros medicamentos para la presión arterial alta.
• tabletas líquidas o diuréticos
• litio o medicamentos que contienen litio (por ejemplo, Lithicarb ®)
• tabletas de potasio (por ejemplo, Span-K, Slow-K, Mag-K)
• sustitutos de la sal que contengan potasio (por ejemplo, Pressor-K)
• medicamentos antiinflamatorios (se utilizan para aliviar el dolor, la hinchazón y otros síntomas de la inflamación, incluida la artritis) e incluyen agentes antiinflamatorios no esteroideos: AINE (por ejemplo , Voltaren , Indocid , ibuprofeno) e inhibidores de la COX-2 (por ejemplo , Celebrex)
Tomar una combinación de VASCUTAN PLUS y un medicamento antiinflamatorio, solo o con un diurético tiazídico (tableta líquida) puede dañar sus riñones. También puede reducir el efecto que VASCUTAN PLUS tiene sobre la reducción de la presión arterial.
• un medicamento que contenga aliskirén .
Tomar VASCUTAN PLUS con aliskiren puede afectar su presión arterial, el equilibrio electrolítico y la función renal.
• bebidas alcohólicas
• pastillas para dormir
• medicamentos fuertes para el dolor (por ejemplo, narcóticos como la codeína o la morfina)
• medicamentos para la diabetes (tabletas o cápsulas orales o insulinas)
• suplementos de calcio, medicamentos que contienen calcio o medicamentos ahorradores de calcio (por ejemplo, terapia con vitamina D)
• medicamentos para la gota
• polvo o gránulos utilizados para ayudar a reducir el colesterol (Questran Lite o Colestid Granules)
• medicamentos para el corazón como digoxina o medicamentos antiarrítmicos (por ejemplo, Sotacor ®)
• medicamentos corticosteroides como prednisona, cortisona o ACTH
• medicamentos utilizados para tratar el cáncer (medicamentos citotóxicos)
• amantadina (Symmetrel®), un medicamento que se usa para tratar enfermedad de Parkinson o para prevenir influenza
• medicamentos anticolinérgicos, que se pueden usar para tratar la enfermedad de Parkinson, para aliviar los calambres o espasmos estomacales o para prevenir el mareo durante el viaje
• carbamazepina, un medicamento anticonvulsivo (como Tegretol®)
• medicamentos utilizados durante la cirugía
• medicamentos utilizados en una situación de emergencia como la adrenalina
Su médico decidirá si es necesario modificar su tratamiento o si debe hacerse controles con más frecuencia.

CÓMO TOMAR LOS TABLETAS DE VASCUTAN PLUS

Las tabletas deben tomarse regularmente según las indicaciones de su médico.
Las tabletas deben tragarse con un vaso de agua.

Cuánto tomar: Las tabletas de VASCUTAN PLUS normalmente serán prescritos por su médico si el tratamiento anterior no no produce una caída suficiente tu presión arterial. Tu doctor le dirá cómo cambiar de su tratamiento anterior a VASCUTAN PLUS tabletas.
La dosis habitual de VASCUTAN PLUS es de una tableta al día. El efecto total de reducción de la presión arterial debe alcanzarse de 4 a 6 semanas después de comenzar el tratamiento. Si su presión arterial no se reduce satisfactoriamente con las tabletas de VASCUTAN PLUS, su médico puede recetarle otro medicamento para tomar con VASCUTAN PLUS.

Cuando tomarlo: Siempre debes tomar tu dosis diaria dosis de VASCUTAN PLUS aproximadamente a la misma hora cada día. Tomando tu VASCUTAN PLUS tabletas a la misma hora cada día tendrá el mejor efecto No importa ya sea que tomes VASCUTAN PLUS tabletas antes o después de la comida.

Cuánto tiempo tomarlo: VASCUTAN PLUS tabletas ayudar a controlar su nivel alto de sangre presión, pero no lo cure. Por lo tanto, VASCUTAN PLUS Las tabletas de RBX deben tomarse cada día. continuar tomando VASCUTAN PLUS tabletas
hasta que su médico le diga que deje de hacerlo.

Si olvida una dosis: Si es casi la hora de la siguiente dosis, sáltese la dosis que olvidó y tome su próxima dosis cuando esté destinado a De lo contrario, tómalo tan pronto como lo recuerdas, y vuelve a tomando sus tabletas como lo haría normalmente. si no estás seguro si omitir la dosis, hable con su médico o farmacéutico. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Si tiene problemas para recordar tome sus tabletas, pregunte a su farmacéutico para algunos consejos.

Si toma demasiado VASCUTAN PLUS (sobredosis)
Llame inmediatamente a su médico o Centro de Información Toxicológica (teléfono: XXXXXXXXX) o diríjase al Departamento de Accidentes y Emergencias de su hospital más cercano, si usted o cualquier otra persona puede haber tomado demasiado VASCUTAN PLUS. Hágalo incluso si no hay signos de incomodidad o envenenamiento.
Si toma demasiadas tabletas de VASCUTAN PLUS, probablemente se sentirá aturdido o mareado.

MIENTRAS ESTÉ TOMANDO TABLETAS DE VASCUTAN PLUS

Cosas que debes hacer:
• Si se queda embarazada mientras toma VASCUTAN PLUS, informe a su médico inmediatamente.
• Controle su presión arterial cuando su médico se lo indique, para asegurarse de que las tabletas de VASCUTAN PLUS estén funcionando.
• Si está a punto de comenzar con cualquier medicamento nuevo, informe a su médico y farmacéutico que está tomando tabletas de VASCUTAN PLUS.
• Levántese despacio al levantarse de la cama o ponerse de pie. Es posible que se sienta aturdido o mareado mientras toma las tabletas de VASCUTAN PLUS. Esto puede empeorar si se pone de pie rápidamente, ya que su presión arterial puede bajar. Levantarse lentamente, especialmente cuando se levanta de la cama o de las sillas, ayudará a que su cuerpo se acostumbre al cambio de posición y presión arterial. Si se siente mareado o aturdido, hable con su médico.
• Si planea someterse a una cirugía u otro tratamiento (incluso en el dentista) que requiera anestesia, asegúrese de informar a su médico o dentista que está tomando tabletas de VASCUTAN PLUS.
• Asegúrese de beber suficiente agua durante el ejercicio y cuando haga calor cuando esté tomando las tabletas de VASCUTAN PLUS, especialmente si suda mucho. Si no bebe suficiente agua mientras toma las tabletas de VASCUTAN PLUS, puede desmayarse o sentirse mareado o enfermo. Esto se debe a que su cuerpo no tiene suficiente líquido y su presión arterial es baja. Si continúa sintiéndose mal, informe a su médico.
• Si tiene vómitos y/o diarrea excesivos mientras toma tabletas de VASCUTAN PLUS, informe a su médico. Esto también puede significar que está perdiendo demasiada agua y que su presión arterial puede bajar demasiado. Siga cuidadosamente todas las instrucciones que le dé su médico. Pueden diferir de la información contenida en este prospecto.
Si no entiende las instrucciones de la caja, pida ayuda a su médico o farmacéutico.

Cosas que no debes hacer:
• No le dé VASCUTAN PLUS a nadie más, incluso si tienen la misma condición que usted.

Crassula®

Cosas a tener cuidado de:
• Tenga cuidado al conducir o manejar maquinaria hasta que sepa cómo le afecta VASCUTAN PLUS. Al igual que con muchos otros medicamentos utilizados para tratar la presión arterial alta, las tabletas de VASCUTAN PLUS pueden causar mareos o aturdimiento en algunas personas. Asegúrese de saber cómo reacciona a VASCUTAN PLUS antes de conducir un automóvil, operar maquinaria o hacer cualquier otra cosa que pueda ser peligrosa si está mareado o aturdido. Si bebe alcohol, los mareos o el aturdimiento pueden ser peores.
• La hidroclorotiazida contenida en este medicamento podría dar un resultado analítico positivo en una prueba antidopaje.

Efectos secundarios
Las tabletas de VASCUTAN PLUS ayudan a la mayoría de las personas con presión arterial alta, pero pueden tener efectos secundarios no deseados en algunas personas.
Todas las medicinas pueden tener efectos secundarios. A veces son serios. La mayoría de las veces no lo son.
Informe a su médico o farmacéutico lo antes posible si no se siente bien mientras toma VASCUTAN PLUS tabletas.
Informe a su médico si nota algo de lo siguiente y le preocupa:
• dolor de cabeza
• mareos o aturdimiento (vértigo)
• cansancio o debilidad inusual, fatiga
• dolor en el estómago o intestino; náuseas y/o vómitos
• problemas sexuales

Generalmente son leves y normalmente no requieren la interrupción del tratamiento.
Informe a su médico inmediatamente si nota alguno de los siguientes:
• erupción o picazón en la piel
• dolores musculares o articulares, no causados por el ejercicio
• dolor muscular, debilidad o parálisis de los músculos
• zumbidos, zumbidos u otros ruidos persistentes en los oídos
• cambios en el ritmo cardíaco
• no está orinando (pasando agua) tanto como lo normal
• entumecimiento u hormigueo en los dedos de las manos o de los pies
• articulaciones dolorosas e hinchadas que pueden ser síntomas de gota
• desmayo
• coloración amarillenta de la piel y/o los ojos, también conocida como ictericia
• síntomas que pueden ocurrir si ha desarrollado diabetes, como sed excesiva, aumento de la cantidad de orina, aumento del apetito con pérdida de peso, sensación de cansancio, somnolencia, debilidad, depresión, irritabilidad y malestar general
• síntomas que pueden indicar una enfermedad renal, como orinar poco o nada, somnolencia, náuseas, vómitos, dificultad para respirar, pérdida del apetito y debilidad
• síntomas que pueden indicar niveles elevados de potasio en la sangre, como náuseas, diarrea, debilidad muscular y cambios en el ritmo cardíaco
• alteraciones en la visión (como visión borrosa y ver halos alrededor de las luces) y dolor en los ojos

Estos son efectos secundarios serios. La erupción cutánea y la picazón pueden ser síntomas de una reacción alérgica.
Es posible que necesite atención médica.

Estos efectos secundarios no son comunes.
Si ocurre algo de lo siguiente, deje de tomar las tabletas de VASCUTAN PLUS e informe a su médico de inmediato o acuda a Accidentes y Emergencias en su hospital más cercano:
• hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta, que puede causar dificultad para tragar/respirar o sibilancias, o aparición repentina e intensa de hinchazones rosadas y con picor en la piel, también llamadas urticaria o sarpullido. Estos pueden ser signos de una reacción alérgica grave a las tabletas de VASCUTAN PLUS.
• síntomas que pueden indicar una enfermedad del hígado con náuseas, vómitos, pérdida de apetito, malestar general, fiebre, picazón, coloración amarillenta de la piel y los ojos y orina de color oscuro.

Estos son efectos secundarios muy graves.
Es posible que necesite atención médica urgente u hospitalización.
Estos efectos secundarios son muy raros.
Otros efectos secundarios no mencionados anteriormente pueden ocurrir en algunos pacientes. Si nota cualquier otro efecto no deseado, debe informar a su médico o farmacéutico y pedir su consejo

Descripción del Producto
Las tabletas de VASCUTAN PLUS son tabletas sin recubrimiento, biconvexas, redondas, de color blanco , lisas por ambas caras.

PRESENTACIÓN: Caja de 30 tabletas y caja de 100 tabletas, blister Alu Alu con 10 unidades cada uno.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Almacenar por debajo de 30°C. Proteger de la luz. No congelar.

Mantener fuera del alcance de los niños

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece después de 'F. Ven' en la caja y el blister. La fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.
No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la basura doméstica.
Pregúntele a su farmacéutico cómo desechar los medicamentos que ya no usa. Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

Hecho en India por:
Crassula Pharmaceuticals Private Ltd.
PF-23 GIDC Industrial Estate, City-Sanad-II, Dist-Ahmedabad 382110, Gujrat State, India
Lic. Manuf. No: G/25A/5603-A

Para:
Crassula Pharmaceuticals LLC.
3301 N. University Dr. Suite 100, Coral Springs FL, 33065- EE.UU.
+1 (954) 676-7060
info@crassulapharma.com

Importado y Distribuido en Honduras por:
Drogueria Medicamentos Internacionales, S de R.L
6 Ave, 5 y 6 Calle S.O. Plaza Victoria, Local 11, Barrio El Benque
San Pedro Sula Cortés, Honduras.
Arsa Lic: HN-LEPF-0120-0012

Para más información visitar:
www.crassulapharma.com

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:
pharmacovigilance@crassulapharma.com

Las marcas son propiedad de o licenciadas al grupo de compañías Crassula.
©2023 Grupo Crassula o sus licenciantes.

Crassula®